Chrysope oeufs et larves

La solution efficace pour lutter naturellement contre les pucerons, les thrips, les acariens et les cochenilles des plantes du jardin

QUELLES PLANTES JE PROTÈGE ?

Toutes les plantes du jardin

QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?

Acariens, Cochenilles, Pucerons, Thrips

Je suis la Chrysope, aussi connue comme « la demoiselle aux yeux d'or » et principale prédatrice des pucerons, des acariens et des cochenilles qui se trouvent dans les plantes de votre jardin.

A l'état d'œufs, je suis vert fluo et attachés à mon socle par un petit pédicelle.
Au stade larvaire, je suis une petites larves brunâtres de 3-4 mm avec de grosses mandibules crochetées. Je vie cachées près de mes proies, sous les feuilles et suis mobile surtout la nuit.

Greenapy
Partageons la nature, cultivons la passion !

Chrysope oeufs et larves

Pendant mon stade larvaire qui dure environ 1 mois en été (plus long avec des températures plus basses), je vais me nourrir des œufs, des larves et des adultes. A l'aide de mes deux crochets, je vais attraper mes proies pour me nourrir et injecter ma salive riche en enzymes, causant ainsi leur mort. Je poursuis ma vie larvaire en mangeant entre 200 et 500 ravageurs et peut vivre près de 9 mois en pondant jusqu'à 1000 œufs !

Quelle quantité vous faut-il ?

Pour les plantes basses, plantes d'extérieur, massifs et jardins (larves) :

Utilisez moi sous forme de **larves** ! Saupoudrez moi sur les foyers des ravageurs (4-6 individus par foyer de ravageurs, suivant le volume des végétaux et le niveau d'infestation ou 100 larves pour 10 m²).

Pour les plantes d'intérieur (œufs sur fil) :

A réception de mes œufs verts, laissez la boite à température ambiante et lorsque ces derniers deviennent marrons (environ 2/3 jours) vous pouvez les placer sur vos plantes à proximité des foyers d'infestations.

Déposez directement le fil au cœur du foyer en enroulant le fil autour des branches ou en le nouant (3 fils couvrent environ 3 à 10 plantes). Il est possible de couper les fils et de les déposer sur différentes plantes suivant le niveau de l'attaque.

Au bout d'une semaine, lorsque les œufs sont tous blancs (cela signifie qu'ils ont tous éclos) vous pouvez alors retirer le fil et le composter ou l'enfouir dans le sol pour qu'il se dégrade.

A quelle période de l'année suis-je active ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			■	■	■	■					

Je suis opérationnelle dès que les premiers foyers apparaissent et quand les températures minimales sont entre **15° et 18°C.**

Quelques conseils pour une efficacité optimale :

- Je suis une travailleuse de fond, je dois être lâchée uniquement sur des populations déjà développées de ravageurs.
- Ne pas utiliser d'insecticides après mon installation et **3 semaines avant**.

Un Imprévu ?

Si je ne peux pas être installée dès ma réception, je peux patienter **1 jour maximum** à l'abri de la lumière, de la chaleur, des produits chimiques et entre 13° et 20°C. J'ai mon casse-croute dans ma boîte en attendant de m'attaquer au mets principal.

Grâce à moi, vous participez à la biodiversité de votre jardin !
Je régule naturellement l'interaction entre le nombre de proies et de prédateurs. Et en bonus, je ponds dans votre jardin pour que ma descendance prenne le relais.

BIO CONTRÔLÉ

Greenapy
Partageons la nature, cultivons la passion

www.greenapy.fr