



Coccifly® Adultes

Technologie Vivapack®

COCCIFLY® Vivapack®: le nouveau diffuseur de coccinelles à pose facile, efficace pour lutter naturellement et en toute simplicité contre les pucerons sur les arbres fruitiers et ornementaux.

Mode d'emploi

Comment se présente COCCIFLY® Vivapack®?

COCCIFLY® Vivapack® contient des coccinelles de l'espèce *Adalia bipunctata* prédatrices de pucerons, la coccinelle à deux points, naturellement présente en France.

Les coccinelles sont au stade d'adultes. C'est le stade auquel elles sont les plus mobiles car elles peuvent marcher et voler de plante en plante ou de branche en branche. Elles sont donc parfaitement adaptées pour la protection des arbres qui représentent un gros volume de végétation dans lesquels elles se déplaceront facilement pour y repérer les pucerons. Tout en dévorant jusqu'à 50 pucerons par jour, elles pondent leurs œufs qui prolongeront l'efficacité anti-pucerons lorsque ceux-ci écloreont en créant un élevage au sein de votre jardin.

Ces adultes sont conditionnés dans une boîte Vivapack®, une innovation exclusive à Biotop qui sert à la fois de nid pour leur permettre d'arriver au bon stade, de boîte de transport mais aussi de système idéal pour lâcher les coccinelles en toute simplicité. Son utilisation est rapide et ne demande aucun ustensile.

Les boîtes contiennent également un substrat qui leur sert de cachettes, ainsi que de la nourriture pour toute la durée du transport.

Dans quels cas utiliser les larves de COCCIFLY® Vivapack®?

Les adultes de COCCIFLY® Vivapack® sont à utiliser en cas de présence de pucerons sur les plantes. Elles sont efficaces contre la plupart des espèces de pucerons.

Elles sont essentiellement utilisées en extérieur.

Leur action contre les pucerons est très efficace sur les arbustes et les arbres. Ne pas utiliser COCCIFLY® contre les pucerons jaunes des lauriers roses. Dans ce cas, utiliser COCCILAURE®.

Quand utiliser COCCIFLY® Vivapack® ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COCCIFLY® Vivapack® peut être utilisé de mars à août, tant que les températures moyennes sont de 12/13°C.

Il est conseillé d'appliquer les coccinelles immédiatement dès que les premiers foyers de pucerons sont observés car ceux-ci se développent très rapidement et peuvent endommager les plantes en quelques jours.

L'application doit se faire uniquement en cas de présence avérée de pucerons. Dans le cas contraire, il vaut mieux décaler l'application.

Comment conserver COCCIFLY® Vivapack®?

Il est conseillé d'utiliser COCCIFLY® immédiatement après avoir acquis la boîte. En cas d'impossibilité, il est possible de conserver les coccinelles 1 à 2 jours maximum à l'abri de la lumière, de la chaleur et des produits chimiques dans un environnement frais, comme le bas d'un réfrigérateur. Attention, pendant ce temps les coccinelles risquent de manquer de nourriture et de perdre en efficacité lors de leur lâcher.

Comment manipuler COCCIFLY® Vivapack® ?

COCCIFLY® Vivapack® est prêt à l'emploi. Aucune préparation n'est nécessaire et elles peuvent être utilisées directement après leur acquisition.



www.biotop.fr



Où placer COCCIFLY® Vivapack® ?

Les larves de COCCIFLY® Vivapack® sont à utiliser en protection des arbustes et des petites plantes. La boîte Vivapack® est à accrocher dans les plantes à une branche le plus près possible des amas de pucerons.

Il est possible de déplacer la boîte Vivapack® après quelques heures avant la sortie de toutes les larves de coccinelles pour la positionner à proximité d'un autre foyer de pucerons.

Il est recommandé de placer la boîte Vivapack® à l'abri des rayons directs du soleil.

Comment réaliser l'application de COCCIFLY® Vivapack® ?


Il est conseillé d'accrocher la boîte de préférence le matin ou en fin d'après-midi, en la protégeant des rayons directs du soleil. COCCIFLY® Vivapack® ne demande aucune préparation, il est prêt à l'utilisation.

Immédiatement après l'acquisition de COCCIFLY® Vivapack®, procédez à leur lâcher. Pour cela, il suffit d'arracher la languette de libération des adultes de coccinelles se situant au dos de la boîte.

Accrochez ensuite la boîte Vivapack® par son trou sur une tige ou une branche en la passant par l'encoche prévue à cet effet en haut de l'emballage.



Détachez
la languette ...



et accrochez
à une branche !

Comment suivre l'efficacité de COCCIFLY® Vivapack® ?

Il est nécessaire de laisser en place la boîte Vivapack® tant que des adultes sont encore présents à l'intérieur.

L'efficacité dans les plantes se remarque aisément :

- On peut observer des adultes de coccinelles qui arpentent les plantes à la recherche de pucerons
- Présence de restes de pucerons : les coccinelles en aspirent leur contenu et seule reste leur peau accrochée aux plantes
- Après quelques semaines, il est parfois possible d'observer des œufs de coccinelles (jaunes et de forme allongée), puis des larves

Dans le cas où les populations de pucerons continueraient à progresser quelques semaines après la première application, des applications additionnelles de renfort peuvent être envisagées.

Compatibilité de COCCIFLY® Vivapack®

Les coccinelles sont un moyen de lutte totalement naturel : elles sont donc utilisables en Agriculture Biologique (AB) conformément aux règlements européens en vigueur. Elles ne laissent aucun résidu toxique sur les plantes. Ainsi, les plantes peuvent être consommées immédiatement après l'application des coccinelles.

Les coccinelles étant des insectes, aucun insecticide ne doit être utilisé quelques semaines avant et quelques semaines après le lâcher des coccinelles, y-compris les insecticides biologiques ou de biocontrôle.

De même, il est recommandé de ne pas appliquer d'autres produits de protection des plantes (fongicides par exemple) quelques semaines avant et quelques semaines après le lâcher des coccinelles.

Que faire de l'emballage après utilisation ?

L'intégralité de l'emballage est recyclable. Il est constitué de carton et d'un plastique recyclable. Il peut ainsi être trié et placé dans la poubelle adaptée au tri des cartons et plastiques après avoir séparé les éléments.