

Charançon de l'agave

Nématodes Sc



Très présents dans le sud de la France dans les régions au climat chaud et sec, les agaves sont parfois fragilisés par les attaques du charançon, capable de détruire la plante de l'intérieur.

Cette solution naturelle agit directement sur les larves en stoppant rapidement leur développement et en protégeant durablement la plante. Elle protège également d'autres types de plantes.

QUELLES PLANTES JE PROTÈGE ?

- Agaves
- Yuccas
- Dracaenas
- Dasylirions
- Furcraea



QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?

- Charançon de l'agave



Je suis un ver microscopique, invisible à l'œil nu qui parasite et tue les larves des ravageurs vivants dans le sol et dans les feuilles. Mon action est ciblée.

Nématodes Sc

Charançon de l'agave

Le nématode se faufile dans les galeries creusées par les larves à l'intérieur des agaves. Dès que je repère les proies, je pénètre leur corps entraînant leur mort en quelques jours.

Je me multiplie à l'intérieur de ma proie avant de partir à la recherche de nouvelles larves à parasiter.

En quelques semaines, ma population s'étend dans la plante, stoppant efficacement la progression du charançon.

- Je respecte les autres auxiliaires et les vertébrés
- Les effets de mon action sont visibles dans les 48h à 72h



A quelle période de l'année suis-je actif ?

J F M A M J J A S O N D

Je suis **actif de mars à novembre**, lorsque les températures sont **comprises entre 14 °C et 32 °C**.

Je peux être appliqué dès l'apparition des larves ou en prévention, sur des plantes saines exposées aux attaques.

Pour de meilleurs résultats, **appliquez-moi le soir ou après une pluie**, lorsque le sol et les tissus de l'agave sont bien humides, afin de faciliter ma dispersion dans les galeries.

Quelques conseils pour une efficacité optimale :

- Utiliser dès réception du produit. Il est conseillé d'utiliser la totalité du sachet en une seule fois.
- Éviter tout traitement chimique **7 jours avant et 1 mois après application** (notamment fongicides et nématicides).
- Pulvériser le soir, à l'abri du soleil, pour protéger les nématodes des UV.

Quelle quantité vous faut-il ?

Je suis livré en sachet de **25 millions de nématodes**, mélangés à de la poudre d'argile.

Diluez-moi dans l'eau selon les indications de ma notice, puis **mélangez pendant quelques minutes** pour bien me mettre en suspension.

Versez ensuite ma préparation dans un pulvérisateur ou un arrosoir, et appliquez-moi à la base et au cœur des agaves pour atteindre les larves cachées.

Pendant mon application, **remuez régulièrement le mélange** afin d'éviter que je ne me dépose au fond du récipient.

Un imprévu ?

Si je ne peux pas être appliqué dès ma réception, je peux patienter au **réfrigérateur entre 4 °C et 12 °C** jusqu'à la date limite indiquée sur mon emballage. Il est préférable d'utiliser la **totalité du sachet en une seule fois** pour garantir mon efficacité.

Grâce à moi, vous **traitez vos agaves** tout en préservant l'équilibre naturel du jardin. Je régule les larves du charançon sans perturber les autres espèces. **Mes effets se voient dès 48 à 72 heures** après application.

